

قارچکش‌های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا شهریورماه ۹۷

نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
۱	اپوکسی کونازول+ تیوفانات متیل	رکس دو	٪۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۲/۳/۲۷
	اپوکسی کونازول+ تیوفانات متیل	رکس دو	٪۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	زنگ رزد	گندم	۰/۵ لیتر در هکتار	۹۶/۶/۲۷
۲	آزوکسی استروبین+ دیفنو کونازول	ارتیواتاپ	٪۳۲/۵	SC	سینجنتا	سفیدک پودری	جالیز- مزرعه. گلخانه	مزرعه: یک لیتر در هکتار گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	۸۸/۹/۳۰
۳	آزوکسی استروبین+ سیپرو کونازول	آمیستاراکسترا	٪۲۸	SC	سینجنتا	زنگ زرد	گندم	۰/۷۵ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
۴	اسپیروکسامین+ تبو کونازول+ تریادیمنول	فالکن	٪۴۶	SC	بایراگ	زنگ زرد	گندم	۰/۶ لیتر در هکتار	۹۲/۸/۲۷
	اسپیروکسامین+ تبو کونازول+ تریادیمنول	فالکن	٪۴۶	SC	بایراگ	فوزاریوم سنبله	گندم	۰/۷-۰/۸ لیتر در هکتار	۹۴/۳/۲۵
۵	اکسی کلرور مس+ سیمو کسانیل	کوپروسیت سی	٪۴۳/۹۵	WP	اگریا	سفیدک داخلی	خیار	۳ کیلو در هکتار	۹۴/۶/۲۳

۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	۱۵ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	۶
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	۱۵ روز	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۴/۷/۶	۱ کیلوگرم در هکتار	۱۵ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۶/۴/۱۹	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-----	برنج	پوسیدگی طوقه و ریشه برنج	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	%۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۸۶/۱۰/۱۰	%۲ وزن غده	-----	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	%۵۰	رورال	ایپرودیون	۷
۹۶/۳/۱	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	برنج	بلاست	نیپون نوهیاکو	EC	%۴۰	فوجی وان	ایزوپروتیولون	۸
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵-۰/۵ کیلو در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	%۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	۹
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷ روز	سیبزمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	%۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	
۱۸/۲۴ ۹۵	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	انگور	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	%۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	

۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پردیس	SC	٪۱۸	میشو بردوکس	بردو	۱۰
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلولپاشی توام با پانسمن شانکر با بردو کیمیا ۸ درصد	۷ روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرای	کاوش کیمیا کرمان	SC	٪۱۸	بردو کیمیا	بردو	۱۱
۹۶/۱۱/۱۶	۱۰ در هزار	۷ روز	زردآلو	غربالی	البرز بهسم	SC	٪۱۸	بردو بهسم	بردو	۱۲
۹۶/۲/۲۵	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	٪۱۸	بردو سیف	بردو	۱۳
۹۶/۳/۱	۸-۵ در هزار در زمان ریزش برگها در پاییز و تورم جوانهها در بهار	۷ روز	هلو	پیچیدگی برگ	سمیران	SC	٪۲۰	بردو سمیران	بردو	۱۴
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک کرکی	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردو فیکس	بردو فیکس	۱۵
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار مناطق مرطوب	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک سطحی	ب آ اس اف	WG	٪۳۸	بلیس	بوسکالید+ پیراکلو استروبین	۱۶

۹۴/۱۲/۱۰	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	پودری گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	۱۷
۹۵/۳/۱۷	۰/۵ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	٪۳۳/۴	سیگنوم	بوسکالید+ پیراکلوستروبین	
۸۹/۹/۲۹	۰/۵ در هزار	۷ روز	هلو- شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	٪۳۰	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	۱۸
۹۶/۹/۱۳	۰/۴ در هزار		خیار	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	٪۳۰	کولیس	بوسکالید+ کرزوکسیم متیل	
۹۰/۱۲/۱	۵ در هزار	----	جالیز- گلخانه	سفیدک پودری	کیمیاسبز آور	SP	٪۸۵	کالیبان	بی کرینات پتاسیم	۱۹
۸۹/۳/۱۰	۱۵-۱۰ میلی- لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	----	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آگ	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیو کونازول+ تبوکونازول	۲۰
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	----	گندم	سیاهک آشکار	بایر آگ	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیو کونازول+ تبوکونازول	
۹۶/۴/۱۹	۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر		جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیو کونازول+ تبوکونازول	

۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزرعه به صورت شنی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خیار	بوته میری	بایر آگ	SL	%۸۴	پروپکورانتری	پروپامو کارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	۲۱
۹۲/۸/۲۷	۲ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	%۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	۲۲
۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بایر آگ	SC	%۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدروکلراید+ فلوپیکولید	
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	***	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگریفار	SC	%۴۵	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدروکلراید+ سیموکسانیل	۲۳
۹۶/۱۱/۳۰	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دوهفته پس از انتقال نشا		خیار	بوته میری <i>Pythium aphnidermatum</i>	اگریفار	SL	% ۷۲/۲	پروپلنت	پروپامو کارب هیدروکلراید	۲۴

۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر متر مربع	***	قارچ خوراکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	٪۵۰	آکورد	پروکلراز	۲۵
۸۶/۲/۳	۱/۲۵ در هزار (ضد عفونی بذر)	----	سیب زمینی	شانکر ریزو کتونایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	٪۲۵	مونسرن	پنسیکرون	۲۶
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	----	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکرو تنیایی	بایر آگ	EW	٪۲۵	فولیکور	تبوکونازول	۲۷
۹۵/۹/۲۹	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	----	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بیسترفیلد	FS	٪۶	آرتمیس	تبوکونازول	۲۸
۸۸/۸/۱۱	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه و ۰/۴ در هزار در گلخانه	۳ روز	جالیز	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	٪۱۰	دومارک	تبوکونازول	۲۹
۹۲/۳/۲۷	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	ایزاگرو	EC	٪۱۰	دومارک	تبوکونازول	
۸۹/۱۰/۱۳	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	---	گندم	سیاهک آشکار	ایزاگرو	LS	٪۱۲/۵	لوسپل	تبوکونازول	۳۰
۸۹/۱۰/۱۳	۳۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	---	گندم	سیاهک پنهان	ایزاگرو	LS	٪۱۲/۵	لوسپل	تبوکونازول	
۹۰/۷/۴	۰/۸-۱ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	٪۱۲/۵	امی ننت	تتراکونازول	۳۱

۸۹/۳/۱۰	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	---	جو	سیاهک آشکار	بایر آگ	DS	%۷/۵	بایتان	تریادیمنول	۳۲
۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	---	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	%۲۰	رنال	تری تیکونازول	۳۳
۸۸/۸/۱۱	۲۰۰ گرم در هکتار	۱ روز	جالیز- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	%۵۰	فلینت	تری فلوکسی استروبین	۳۴
۹۶/۵/۲	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	%۵۰	فلینت	تری فلوکسی استروبین	
۹۲/۳/۶	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	بایر آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۳۵
۹۴/۵/۱۲	۰/۲-۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	
۹۵/۶/۱	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	
۹۵/۶/۱	۲۰۰ گرم در هکتار	----	چغندر قند	سفیدک پودری	بایر آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	
۹۶/۹/۱۳	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	شیت بلایت	بایر آگ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	
۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	۳۶
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	%۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام	

۹۶/۵/۲	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی - مزرعه	سفیدک پودری	بایر آگ	SC	٪۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین+ فلوپیرام	
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۳ در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	٪۱۹	ساپرول	تریفورین	۳۷
۸۰/۳/۲۱	----	----	مرکبات	انبارداری	---	WAX	٪۰/۷	سیترازول آ	تیابندازول+ ایمزالیل	۳۸
۹۰/۳/۳۰	۰/۵-۰/۴ کیلوگرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	٪۷۲/۵	ویستا	تیوفانات متیل+ تری سیکلازول	۳۹
۹۷/۶/۲۷	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار		گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	SC	٪۴۷/۹	رکس دو	تیوفانات متیل+ اپوکسی کونازول	۴۰
۸۹/۳/۱۰	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	----	جو	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	٪۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنو کونازول+ سایپرو کونازول	۴۱
۸۹/۹/۱	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	----	گندم	سیاهک آشکار	سینجنتا	FS	٪۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنو کونازول+ سایپرو کونازول	
۹۴/۱۲/۱۰	۲ لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	EC	٪۱۱/۲	کابریو دو	دیمتومورف+ پیراکلوستروبین	۴۲
۹۴/۸/۲۵	۲ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	ب آ اس اف	WG	٪۶۹	آکروبات ام زد	دیمتومورف+ مانکوزب	۴۳
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	***	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکروتنیایی	سینجنتا	SC	٪۴۲	آلتو کمی	سایپروکونازول+ کاربندازیم	۴۴
۹۱/۳/۸	۰/۴-۰/۵ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	٪۴۰	رانمن	سیازوفامید	۴۵

۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	***	سیب زمینی	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	٪۴۰	رانمن	سیازوفامید	
۹۶/۵/۲	۱/۵ در هزار	۳ روز	خیار- گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	٪۱۰	رانمن	سیازوفامید	
۹۲/۴/۱۷	۳ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	بیسترفیلد	WG	٪۸۰	سولفولاک	سولفور	۴۶
۹۲/۸/۲۷	۲/۵ در هزار		انگور	سفیدک پودری	سمیران	SC	٪۸۰	گوگرد سمیران	سولفور	۴۷
۹۳/۶/۱۰	۳/۷۵ در هزار	۲۰ روز	شلیل	سفیدک پودری	ارکیده سازان	SC	٪۴۰	سولفور ارکیده سازان	سولفور	۴۸
۹۲/۱۲/۵	۲/۵ در هزار	۳۰ روز	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	٪۸۰	الیت	فوزتیل آلومینیوم	۴۹
۹۶/۵/۲	۲ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	گموز	دوگال	WP	٪۸۰	رودر	فوزتیل آلومینیوم	۵۰
۹۵/۸/۲۴	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۷ روز	انگور	سفیدک داخلی	بایر آگ	WG	٪۷۱/۱	پروفایلر	فوزتیل آلومینیوم+ فلوپیکولید	۵۱
۸۷/۵/۲	۰/۲ در هزار	۴ روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	٪۵۰	استروبی	کروزکسیم متیل	۵۲
۹۳/۴/۲	۳۰ گرم در یک لیتر آب و کاربرد به روش رنگ آمیزی	----	مرکبات	گموز	ماسو	WP	٪۶۵	آیادو سی تی ال	مانکوزب+ کلروتالونیل+ سیمو کسانیل	۵۳

۸۶/۸/۲۸	یک بسته ۷ گرمی برای نگهداری ۵ کیلوگرم انگور	----	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوشه	پد کاغذی	۷ گرم متا بی سولفیت	سولفور پد	متا بی سولفیت سدیم	۵۴
۹۶/۴/۱۹	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	٪۷۲	داونی جی	متالاکسیل+ مانکوزب	۵۵
۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهاور شیمی	WP	٪۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل+ مانکوزب	۵۶
۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	بهارو شیمی	WP	٪۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل+ مانکوزب	

۹۵/۶/۲۹	۳-۴ در هزار	صفر روز	خيار- گلخانه	سفیدک داخلی	J I Biotech	SL	٪۵۳	فسفایت	مونو و دی پتاسیم اسیدفسفونیک	۵۷
۹۵/۱۰/۲۷	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۱۰ روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	٪۳۰	تاچی گارن	های مکسازول	۵۸
۹۵/۶/۲۹	۴ در هزار	---	لیمو ترش	چاروک	جاوید شیمی فارس	SL	٪۱۳	آزینو	---	۵۹
۹۶/۸/۲۹	مزرعه: ۱۰ در هزار گلخانه: ۷/۵ در هزار	---	خيار	سفیدک پودری	JH.biotech	SL	-	میلدی کیور	عصاره گیاهی	۶۰
۹۷/۲/۲۴	۱۸۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	گیاه پرنیان اطلس	WP	-	کانگ می	<i>Bacillus subtilis</i>	۶۱
۹۷/۲/۱۰	۶۰ کیلوگرم برای ۴ تن سیب زمینی (بذرمال کردن)	-	سیب زمینی	پژمردگی ورتیسلیومی (بذور مصرفی)	بهاران دشت ساحل		-	تالارومین	<i>Talaomyces flavus</i> TF PO V52	۶۲